



16 mai 2023
n° 10

MARDI 16	MERCREDI 17	JEUDI 18	VENDREDI 19	SAMEDI 20	DIMANCHE 21	LUNDI 22
9° / 17°	5° / 17°	8° / 17°	9° / 16°	9° / 18°	11° / 19°	12° / 19°
↓ 15 km/h	↓ 15 km/h	↓ 15 km/h	▶ 10 km/h	↓ 10 km/h	↓ 10 km/h	↓ 15 km/h
7 à 10 mm	-	-	1 à 6 mm	1 à 4 mm	2 mm	5 à 8 mm

Source : météo.france.com - Tarbes

Données météo

données actualisées au	Précipitations		Somme de températures depuis le 1 ^{er} février (°C-jour)			ensilage-enrubanné prairies précoces		Foin de qualité prairies précoces
	7 derniers jours	30 derniers jours	2023	2022	année moy	800 °j	850 °j	
15-mai-23								1100 °j
Ossun	45 mm	90 mm	991°	1079	993	30-avr	5-mai	22-mai
Vic-en-Bigorre	65 mm	107 mm	1038°	1137	1065	28-avr	2-mai	19-mai
Campistrous	83 mm	147 mm	914°	1010	904	6-mai	9-mai	28-mai
Lomné	80 mm	154 mm	981°	1071	969	1-mai	5-mai	23-mai
Adast	74 mm	101 mm	906°	1077	892	6-mai	10-mai	28-mai
Castelnau-Magnoac	55 mm	111 mm	1006°	1059	1026	29-avr	3-mai	21-mai

Estimation selon altitude depuis le 1^{er} février

A 200m	A 300m	A 400m	A 500m	A 600m	A 700m	A 800m	900m	1000m
	Tarbes		Bagnères	Lannemezan		Luz		
1037°jour	1006°jour	964°jour	932°jour	912°jour	846°jour	781°jour	756°jour	730°jour

Repères intervention

	Fin déprimage	Ensilage, enrubanné, séchage en grange	Foin de bonne valeur alimentaire
Prairie temporaire	500 °Cjour	800 °Cjour	1000 °Cjour
Prairie permanente fertile et précoce	500 °Cjour	900 °Cjour	1100 °Cjour
Prairie permanente plus tardive	800 °Cjour	1000 °Cjour	1200 °Cjour

A faire cette semaine

- Les conditions froides et humides ralentissent la pousse de l'herbe et retardent les chantiers d'ensilage et d'enrubannée.
- La période propice aux premières coupes de foin se rapproche mais les sols sont trop humide et la météo trop incertaine. Il faudra couper dès que les conditions le permettront.
- Au niveau pâturage, il faut maintenir une pression de pâturage importante pour éviter que les graminées n'épient (signe d'une baisse de la valeur de l'herbe). Attention cependant à la portance des sols et au piétinement (cf. ci-dessous). N'hésitez pas à enrubanner dès que possible les parcelles dont l'herbe est trop haute. En cas de refus, vous pouvez également broyer les parcelles dès la sortie des animaux pour permettre une repousse de qualité.



Préserver ses prairies par temps de pluie

Les pluies qui tombent actuellement font craindre des problèmes de piétinement.

S'il est vrai que certaines prairies peuvent être particulièrement sensibles au piétinement, il est rare que ce soit le cas de toutes les prairies d'une exploitation.

Des alternatives existent :

- **Sacrifier une partie d'une prairie** pour y mettre les animaux quand les conditions se dégradent vraiment (prairie qui se trouve à un endroit central par rapport au circuit de pâturage des animaux). L'herbe actuelle étant très riche en azote, n'hésitez pas à compléter avec du fourrage sec (foin ou paille selon disponibilité).
- **Jouer sur le chargement** en augmentant les surfaces proposées au pâturage : donner accès à plusieurs prairies en même temps, ce qui n'est pas gênant en début de saison, ou diminuer le nombre d'animaux (en ne mettant à l'herbe qu'un lot),
- Surveiller la météo pour anticiper les pluies et amener les animaux sur une prairie plus portante, voir **les rentrer momentanément dans les bâtiments** si les stocks fourragers restant sont suffisants.